



T.C.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doküman Kodu	HHD.FR.10
Yayın Tarihi	30.05.2025
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa No	04

**LOKAL ANESTEZİ-FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMA-FLOR UYGULAMA-
DIŞ TAŞI TEMİZLİĞİ-DOLGU-PROTETİK RESTORASYON-KANAL
TEDAVİSİ-APEKSİFİKASYON-DEVİTAL BEYAZLATMA AYDINLATMA ve
ONAM (RIZA) FORMU**

Sayın Hasta, Sayın Veli/ Vasi;

Bu onam formu size/hastanıza anlatılan ve uygulanacak olan tanı ve tedavi yöntemlerinin niteliği, işlem/işlemlerden beklenen yararları, olası yan etkileri, alternatif tanı ve tedavi seçenekleri ve bunların özellikleri, bu işlem/ işlemler gerçekleştirilmez ise hangi sonuçlara yol açabileceği gibi konularda sizi aydınlatmak ve rızanızı almak için hazırlanmıştır. Bu formu okuyup, onaylayarak işlem konusunda aydınlatıldığınızı ve işlemin yapılmasına özgür iradenizle onay verdiğinizi beyan etmekteyiz. Form içerisinde anlamadığınız noktaları doktorunuza sorabilirsiniz.

BİLMENİZ GEREKENLER

LOKAL ANESTEZİ

Tanı ve İşlem: Lokal anestezi ağrı hissini azaltmak amacıyla yapılmaktadır.

İşlemden beklenen faydalar: Anestezik etki yapmaktır.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Yapılacak işlemler(tedaviler) sırasında ağrı duyulur.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: İşlem sırasında alerjik reaksiyon gelişebilir, his kaybı, bulantı ve kusma olabilir.

İşlemin tahmini süresi: 30 dakika-2 saat sürebilir.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: En az 2 saat uyuşukluk geçene kadar yeme-içme ve çiğneme yapmayınız.

FİSSÜR ÖRTÜCÜ

Tanı ve İşlem: Arka dişler üzerindeki girintiler gıda artıklarının en çok biriktiği ve en zor temizlenen bölgelerdir. Bu bölgeler şeffaf veya beyaz renkte, sıvı şeklinde koruyucu madde uygulaması ile örtülerek diş çürüğünün gelişimi önlenmeye çalışılmaktadır.

İşlemden beklenen faydalar: Diş minesinde oluşabilecek çürüğü engeller. Akıcı kıvamda olduğundan diş yüzeyindeki herhangi bir aşındırma işlemi yapılmaksızın uygulanır ve yükseklik oluşturmaz.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Dişler ağza ilk sürdüğünde minesi tam olarak kalsifiye olmadığından (olgunlaşmadığından) genellikle çürüğe daha dirençsizdir ve çürük oluşumuna daha yatkındır. Bu nedenle dişlerde daha hızlı çürümeye meydana gelebilir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: İşlem sırasında alerjik reaksiyon gelişebilir, bulantı ve kusma olabilir.

Sert yiyecekler tüketilirse kırılabilir ve yenilenmesi gerekebilir.

Hasta ağız bakımını yeterince yapmazsa örtücüye rağmen çürük oluşabilir.

İşlemin tahmini süresi: 5 dakikadır.(Her bir diş için)

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Sakız gibi dişe yapışkan yiyecekler en az 2 saat tüketilmemelidir.

Sert gıdalar tüketilmemelidir.

FLOR UYGULAMASI

Tanı ve İşlem: Yüksek konsantrasyondaki flor preperatlarının cila şeklinde diş yüzeylerine sürülmesi yada jel formunda uygun boyutlardaki kaşıklarla çenelere uygulanması ile diş yüzeylerinde çürük oluşumunu engellemek amacı ile yapılmaktadır. Flor diş yüzeylerinin sertliğini artırarak çürüğe karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamaktadır.

İşlemden beklenen faydalar: Çocuklarda diş çürüklerini azaltmak için kullanılan koruyucu diş hekimliği yöntemidir. Yerel flor uygulaması özellikle dişleri çürümeye meyilli çocuklara uygulanır. Bu sayede dişler üzerinde flor depolanır, dişlerin yapısı güçlenerek çürüğe karşı daha dayanıklı olur. İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Dişler asit ataklarına karşı daha az dayanıklı olur ve çürük oluşumu artabilir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: Yerel flor uygulamasının her 6 ayda bir yapılmasının herhangi bir riski ve komplikasyonu yoktur. Ancak işlem sırasında alerjik reaksiyon gelişebilir, bulantı, kusma ve zehirlenme olabilir, dişlerde renkleşme görülebilir.

İşlemin tahmini süresi: 5 dakika sürer.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: İşlem sonrasında yarım saat herhangi bir şey yeme-içme önerilmez. Aynı gün diş çekimi gibi kanamalı bir işlem yaptırılmaz. Florun etkisini azalttığı için süt ürünleri, uygulamanın yapıldığı gün içinde tüketilmemelidir.

Diş Taşı Temizliği

Tanı ve İşlem: Diş taşları, diş ve dişetlerinizin birleşim bölgesine bazen de diş etlerimize altına yerleşmiş ve sertleşmiş birikintilerdir. Diş taşı temizliği sırasında bu kayalaşmış eklentiler uzaklaştırılır. Diş taşları tek başlarına zararlı değildir, ancak girintili çıkıntılı yapılarıyla birçok bakteri ve mikroorganizmaya tutunacak ve yapışacak alan yaratırlar.

İşlemden beklenen faydalar: Diş taşı ve plağın uzaklaştırılması ile dişeti enfeksiyonu ortadan kalkar. Hastanın oral hijyeni artırılarak diş ve çevresi dokuların sağlığı korunur.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Dişeti enfeksiyonuna yol açan bakterilerin bulunduğu plak, diştaşı gibi birikintiler uzaklaştırılmazsa diş etlerinde kanama ve çekilme daha ileri durumlarda kemik kaybı görülebilir, dişlerin erken sallanması ve çürük olmadığı halde kaybedilmesi söz konusu olabilir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: Temizlik sırasında hassasiyet olabilir.Diş taşı temizliği sonrasında bir miktar kanama olabilir.

Kanama var diye diş fırçalamayı aksatmayın 2-3 gün içerisinde bu durum düzelecektir.

Tedavi süresince ağrı ve rahatsızlık hissi, şişlik, enfeksiyon, kanama, yandaki dişte ve yumuşak dokuda yaralanma, geçici veya kalıcı hissizlik ve alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

İşlemin tahmini süresi: 30 dakikadır.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Hekim tarafından önerilen ağız gargaralarının düzenli olarak kullanılması gerekir. Aynı zamanda diş fırçalama ve diş ipi kullanımı düzenli olarak yapılmalıdır

DOLGU

Tanı ve İşlem: Çürük, zayıflamış veya kırık nedeniyle ortaya çıkan diş dokusu kayıplarının dolgu materyalleri ile yerine konarak diş sağlığının geri kazandırılmasıdır.

Tedaviye başlamadan önce, çocuğunuzun geçirmiş olduğu bulaşıcı hastalıklar, var olan bir sistemik rahatsızlık (kalp hastalığı, diyabet, kanama bozukluğu vb.) veya alerji durumunu hekiminizle paylaşmanız önem arz etmektedir.

Tedavi sırasında ve sonrasında ilaç tedavisi gerekebilir. Reçete edilen ilaçların kullanım süreleri ve şekilleri hekiminizin belirttiği şekilde yapılmalıdır. İlaça bağlı herhangi bir yan etki gelişmesi halinde mutlaka hekiminize başvurmanız gerekmektedir.

Tedavi sırasında ağrı ve acı hissetmenizi engellemek için lokal (sınırlı bir alanın uyuşturulması) veya bölgesel (sinir dokusunun blok halinde uyuşturulması) anestezi gerekebilir. Lokal anestezi uygulamasını takiben meydana gelen uyuşukluk etkisi 1-4 saat kadar sürebilir. Anestezi sonucu fasiyal paralizi (geçici yüz felci), amfizem (yüzde şişlik), hematoma (yüzde kızarma, morarma) gibi komplikasyonlar oluşabilir. Uyuşukluğa bağlı dudak, yanak ve dil ısırmasına bağlı travmatik yaralanmalar meydana gelebilir. Bazen alt dudakta ve dilde anesteziye bağlı olarak geçici ya da kalıcı uyuşukluk oluşabilir. Ayrıca anestezi sonrasında alerjik reaksiyon (anafilaktik şok) gelişme ihtimali bulunmakta ve acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Alerji riskini azaltmak için tedaviye başlamadan önce ve reçete (ilaç) yazılacağı zaman herhangi bir maddeye karşı mevcut alerji durumunuz (penisilin alerjisi vb.) hakkında hekiminize bilgi vermeniz gerekmektedir. Anestezi uygulaması yapılmaması tedavi sırasında ağrı hissetmenize ve tedavinin gerçekleştirilememesine sebep olabilir. Lokal anestezi uygulaması sonrasında hekiminizin belirttiği süre boyunca herhangi bir şey yememeniz ve içmemeniz gerekmektedir. Tedaviye başlamadan önce anestezi sırasında yaşanan bir olumsuzluk varsa belirtiniz. İşlemden beklenen faydalar: Çürüğün ilerlemesinin engellenmesi, sıcak soğuk hassasiyetinin, estetik kaygının, iki diş arasında gıda birikmesi gibi sorunların giderilmesi ve dişin çiğneme fonksiyonuna kavuşması beklenir.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Çürük ilerler, apse gelişebilir. Kanal tedavisi veya çekim gerekebilir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: Derin çürüklerde hastanın çok belirgin şikayetleri olmasa bile dişin siniri açığa çıkabilir.

Çürüğün sinire uzaklığına göre dolgudan sonra soğuk sıcak hassasiyeti olabilmektedir. Su içerken dahi ilk zamanlar aşırı hassaslık olabilir.

Birkaç ay ya da daha kısa sürede bu şikayet azalabilir ya da artabilir. Şikayetlerin artması dolgu altında çürük bırakıldığı için değil; sinirin uyarılar etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda kanal tedavisi yapılır. Her dolgu yapımından sonra az ya da çok oranda kanal tedavisi ihtimali vardır.

Kanal tedavisi yapılamayacak kadar kötü durumdaki dişler ise çekilir.

Süt dişlerine yapılan dolgu alttan daimi dişin çıkmasına engel teşkil etmez.

Dolgu yapılırken çalışmaya bağlı olarak dudaklarda ve ağız köşelerinde çatlak ve yırtıklar, şişlikler, morarma ile çene ekleminde ağrı ve hassasiyet ortaya çıkabilir.

Dolgu yapıldıktan sonra ağrı, apse, diş etinde kanama, dolgunun düşmesi ve dişte renk değişikliği olabilir.

İşlem sırasında dolgu materyalin yutulması veya solunum yoluna kaçması görülebilir.

İşlemin tahmini süresi: Dişin ağızdaki konumuna, dolgu tipine, dişteki madde kaybına ve çocuğun uyumuna göre 20 ile 45 dakika arasındadır. Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: KSÜ Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinden taburcu olurken doktorunuz tarafından size reçete edilen ilaçları mutlaka aksatmadan kullanınız. Doktorunuzun aşağıda yazdığı önerilere uyunuz.

Dolgu tedavisinden sonra en az 2 saat uyuşukluk geçene kadar herhangi bir şey yiyip içmeyiniz.

Yapılan dolgunun kırılması ve düşmesi durumunda hasta hemen kliniğe başvurmalıdır.

PROTETİK RESTORASYON

Tanı ve İşlem: Dolgu yapabilmek için yeterli diş dokusunun kalmadığı durumlarda veya travma sonrası kırılan dişlere yeniden fonksiyon kazandırabilmek için kaplama uygulaması yapılmalıdır. Çürük diş dokusu lokal anestezi altında uzaklaştırıldıktan sonra kronun adaptasyonu için kalan diş yapısının kesimi yapılır, piyasada hazır olarak bulunan kronlar veya ölçü

alınmasını takiben laboratuvarında hazırlanan kuronlar yapıştırılarak hasarlı diş tedavi edilir. Uygulanan kuronlar iki çeşit olup paslanmaz çelik ve şeffaf selüloid içeriğine sahiptir. Paslanmaz çelik kronlar metal yapıda olup daha çok arka dişlerde tercih edilir. Strip kuronlar ise şeffaf yapıda olup estetik beklentinin yüksek olduğu ön dişlerde uygulanır.

İşlemden beklenen faydalar: Çok fazla diş dokusu kaybı bulunan dişlerin estetik ve çiğneme fonksiyonuna katkı sağlanması beklenmektedir.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Diş dokusu kaybı fazla olduğu halde kuron uygulanmadan yapılan dolgu kırılabilir, hatta düşebilir. İlgili dişe kanal tedavisi gerekebilir. Dişin kendisi kırılabilir. Apsse oluşabilir. Çekim gerekebilir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları:

Uygulanan kuronlar paslanmaz çelikten üretilmiş olduğu için hasta ağızda metal görünebilmektedir.

Yapıştırma işlemi sonrasında sert yiyecekler ısırıldığında kronlar düşebilir veya kırılabilir.

İşlem sonrası o bölgedeki diş etleri belli bir süre hassas, kanamalı ve ağrılı olabilir.

Süt dişlerine yapılan kuron alttan daimi dişin çıkmasına engel teşkil etmez.

Kuron yapıldıktan sonra hastaya bağlı (yapışkan şekerlemeler, sert gıda tüketimi, vb) nedenlerden dolayı kuronun gevşemesi veya düşmesi gibi durumlar oluşabilir.

İşlem sırasında veya sonrasında kuron materyalin yutulabilir veya solunum yoluna kaçabilir.

İşlemin tahmini süresi: Dişin ağızdaki konumuna ve çocuğun uyumuna göre ortalama 45-60 dakikadır.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: KSÜ Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinden taburcu olurken doktorunuz tarafından size reçete edilen ilaçları mutlaka aksatmadan kullanınız. Doktorunuzun aşağıda yazdığı önerilere uyunuz.

Kuron uygulamasından sonra en az 2 saat boyunca herhangi bir şey yiyip içmeyiniz.

KANAL TEDAVİSİ

Tanı ve İşlem: Dişin içindeki pulpa (sinir) dokusunun, köklerdeki kısmı da kapsayacak şekilde çıkarılması ve enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi işlemidir. Sinir çıkarılıp kanallar temizlendikten sonra kök kanalları uygun dolgu malzemeleri ile doldurulmaktadır.

İşlemden beklenen faydalar: Ağrı varlığı giderilecek, enfeksiyonun yayılması engellenecektir.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Mevcut enfeksiyon ilerler, apse gelişebilir ve diş çekime gidebilir. Kanal tedavisini yaptırmak istemeyen, bulantı refleksinden dolayı film çekirtmekte zorlanan hastalar dişlerini çektirebilir. Çekim sonrası yer tutucu gerekebilir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: Kanal tedavisi yapılırken, kullanılan aletler kanal içerisinde veya dışarısında kırılabilir, bu durumda alet kanal içinde bırakılabilir veya diş çekime gidebilir.

•Ayrıca kök kanalları tıkalı olabilir, buna bağlı olarak kanal doldurulamayabilir, kökün eğriliğine veya tıkalı olmasına bağlı olarak yarım doldurulabilir veya tedavisi yapılamayabilir.

•Diş kanalı perfore olabilir (açılabilir). Açılan bölge dolgu ile doldurulabilir veya diş çekime gidebilir. Buna doktorunuz karar verecektir.

•Kullanılan ilaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar gelişebilir.

•Diş etinde ve ağızda nekroz veya yanık oluşabilir. Diş rengi değişebilir.

•Süt dişi kanal dolgusu sırasında alttaki daimi diş germine kanal aletinin değmesi mümkündür. Bu durum daimi diş germinin hasar görmesine sebep olarak daimi diş yüzeyinde renk değişikliği ve yüzey pürüzlülüğü meydana gelebilir.

İşlemin tahmini süresi: İşlemin tahmini süresi, dişin durumuna ve hastanın uyumuna göre tek seans veya birkaç seansta yapılabilir. Normal şartlarda tedavi 45 dk ile 1 saat arasında sürebilir.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: KSÜ Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinden taburcu olurken doktorunuz tarafından size reçete edilen ilaçları mutlaka aksatmadan kullanınız. Doktorunuzun aşağıda yazdığı önerilere uyunuz.

Tedavi sonrasında dişin kırılma riskindeki artışa bağlı olarak diş duvarlarında kırılmalar görülebilir. Hekim tavsiyesine bağlı olarak ilgili dişe kaplama yaptırılması gerekebilir.

APEKSİFİKASYON

Tanı ve İşlem: Kök gelişimini henüz tamamlamamış genç dişlerde (kök ucu açık), pulpa dokusunun (dişin damar ve sinir içeren kısmı) çeşitli nedenlerle (derin çürükler, travma, vb.) enfekte olması ve canlılığını yitirmesi durumunda uygulanan tedaviye apeksifikasyon denir.

İşlemden beklenen faydalar: Kök ucu açık daimi dişlerin, kök gelişiminin tamamlanarak kök ucunun kapanmasının sağlanması ve başarılı bir şekilde kanal tedavisinin yapılıp, dişin restorasyonunun tamamlanması.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Dişte var olan enfeksiyonun ilerlemesi, ağrının devam etmesi ya da artması, çürüğün ilerlemesi durumunda dişin restore edilemeyecek boyuta gelmesi ve çekilmek zorunda kalınması

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: İşlem sırasında alerjik reaksiyon gelişebilir, bulantı ve kusma olabilir.

•Tedavi sırasında, kullanılan aletler kanal içerisinde veya dışarısında kırılabilir, bu durumda alet kanal içinde bırakılabilir veya diş çekime gidebilir.

•Diş kanalı perfore olabilir (açılabilir). Açılan bölge dolgu ile doldurulabilir veya diş çekime gidebilir. Buna doktorunuz karar verecektir.

•Seanslar arasında veya işlem sonrasında ağrı, apse, diş eti kanaması, şişlik oluşabilir.

•Dişin konumu, hastanın ağız açıklığı, dil, yanak ve komşu dokuların anatomik yapısı nedeniyle çalışma sırasında alet ağız boşluğuna düşebilir. Hasta diliyle refleks olarak kanal aletini geriye itebilir, aspire edebilir. (solunum yoluna kaçabilir)

•Tedavi sonrasında bir hafta on gün kadar dişin üzerine basarken, yemek yerken ağrı şikayeti olabilir. Anestezi yapılan bölgede birkaç gün hassasiyet olabilir. Bu şikâyetin zamanla azalarak geçmesi beklenir.

•Apeksifikasyon tedavisi yapılırken çalışmaya bağlı olarak dudaklarda ve ağız köşelerinde çatlak ve yırtıklar, şişlikler, morarma ile çene eklemde ağrı ve hassasiyet ortaya çıkabilir.

•Apeksifikasyon tedavisi yapılmasına rağmen, tedavinin hemen akabinde veya bir süre sonra dişin çekimi gerekebilir. Tedavi başarılı olsa bile, daha sonra o dişin bir daha ağrımayacağı anlamına gelmez. Bu işlemde bir tür dolgu işlemidir.

İşlem sonrasında ısırmada ağrı duyulabilir. Bu durum geçici bir durumdur. Süresi kişiden kişiye değişebilir.

•Eğer apeksifikasyon tedavisi yapılmasına rağmen, kendiliğinden başlayan zonklama tarzında şiddetli ağrılar oluşursa, dişin çekilmesi gerekebilir. Bu durumda son kararı doktorunuzun vermesi gerekmektedir.

İşlemin tahmini süresi: 45 dakika- 1 saat

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Ağız hijyeninin çok etkili bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

Tedavi sonrasında dişin kırılma riskindeki artışa bağlı olarak diş duvarlarında kırılmalar görülebilir. Hekim tavsiyesine bağlı olarak ilgili dişe kaplama yaptırılması gerekebilir.

DEVİTAL BEYAZLATMA

Tanı ve İşlem: : Kanal tedavisi görüp rengini değiştirmiş dişlere beyazlatıcı ajan uygulanarak 1 hafta arayla hasta çağrılır. Dişler hastayı estetik yönden tatmin edinceye kadar aynı işlem tekrarlanır.

- Tedavinin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek veya göstermemek yine kendi kararınıza bağlıdır.
- Tedaviye başlamadan önce, geçirmiş olduğunuz, sistemik, bulaşıcı hastalıklar veya alerji mevcudiyetinizi hekiminizle paylaşmanız önem arz etmektedir.
- Tüm tedavilerin başarı oranı çok yüksek olmasına rağmen garanti edilemeyeceği, dolayısıyla tedavi edilen dişlerdeki örtücülerin gelen çığneme kuvvetleri sonucu düşebileceği bilinmelidir.
- Tedaviyi reddetme veya sonlandırma hakkınızı kullanmak isterseniz hekiminize bildiriniz.
- Hizmetlerimizde ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetleriniz için; hasta iletişim birimine başvurabilir, fakültemizde bulunan öneri ve dilek kutularını kullanabilir, web sitemizden bizimle iletişime geçebilir, SABİM-CİMER kanalıyla başvuru yapabilirsiniz.

İşlemden beklenen faydalar: Kanal tedavisi sonrası rengi değişen dişlerin normal rengine gelmesi ya da hastanın estetik beklentilerini karşılaması sağlanır.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Hastanın estetiği kötü yönde etkilenir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: Dişteki renklemenin çok şiddetli olması durumunda tedaviye çok geç cevap alınabilir.

Tedavi edilen dişlerde servikal rezorbsiyon (dişin boyun kısmında erime) gibi patolojiler meydana gelebilir, bu durumda gerekli görülen tedavi uygulanır.

İşlemin tahmini süresi: 25 dakika sürer.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Hasta kontrollerine mutlaka gelmelidir.

İŞLEMİNİZİ KİM GERÇEKLEŞTİRECEK?

Bu işlem Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında görevli hekimler ile uygulamada bulunan öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.

VARSA İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ

İşlemin alternatif tedavisi yoktur.

GEREKTİĞİNDE İŞLEM İLE İLGİLİ YARDIMA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Merkezimizi arayarak ilgili bölüme ulaşabilirsiniz.

EĞİTİME KATKIYA ONAY

1. Bu işlemin eğitimde eğitsel rolü olabileceğinden eğitimin geliştirilmesi ve/veya ürün kullanımının geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin ve/veya teknik personelin işleme katılımını; ☐ Kabul ediyorum. / Kabul etmiyorum.
2. İşlem esnasında gerekirse fotoğraf veya video kaydı yapılabileceğini ve bu çekilen kayıtların da kimliğimin açıklanmaması kaydıyla bilimsel amaçlarla kullanılmasını; ☐ Kabul ediyorum. / Kabul etmiyorum.

HASTA ONAY

Bu formda belirtilen bütün hususları okuyup tam olarak anladım. Yapılacak tedavi ve girişimlerin yararları ve yapılamadığı takdirde olabilecekler konusunda bilgilendirildim. Yukarıda açıklanan ifadelere dayanarak; İŞLEMLERİN YAPILMASINI KABUL EDEREK hekim taburcu edene kadar ilgilenilecek olan hemşirelerin yapacakları işlemleri ve tüm tıbbi müdahaleyi, gerektiğinde yatmayı, fakülte kurallarına uymayı kabul ediyorum ve istediğim halde ilgili prosedürlere uyarak tedavimi nasıl ret edebileceğimi biliyorum. Rıza belgesinin bir nüshası E-Arşivimde bulunmaktadır.

☐ Hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, ONAY ve KABUL EDİYORUM.

Hastanın	
Adı Soyadı	
T.C. Kimlik No	

Hastanın Velisi / Vasisi	
Adı Soyadı	
Yakınlık Derecesi	

Tarih		Saat	
-------	--	------	--

İŞLEMİ YAPAN HEKİMİN	
Adı Soyadı	

NOT: E-Onay verilmiş tüm belgeler E-Arşivinizde bulunmaktadır. İstenildiğinde görüntülenebilir ve indirilebilir.